



CANNABIS FLOS AURORA DEUTSCHLAND GMBH

THC ≤ 1%, CBD 12%



Surowiec farmaceutyczny: Cannabis sativa flos – Kwiaty konopi siewnych Cannabis sativa L. (Cannabaceae). Numer pozwolenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu: 30044

Składniki aktywne: Zawartość delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC): nie więcej niż 1% oraz kannabinolu (CBD): 12% (nie mniej niż 10,8% i nie więcej niż 13,2%)

Odmiana dominująca: Hybryda

Cultivar: Cannatonic

Skład:



- β-Mircen
- α-Pinen
- β-Kariofilen
- Limonen

Przedstawione jako procent całkowitej zawartości terpenu. Procenty są wartościami średnimi dla wielu partii.

Terpen	Działanie ¹	Zapach
β-Mircen	Przeciwzapalne, rozluźniające, przeciwbólowe	drzewny, owocowy
α-Pinen	Przeciwzapalne	drzewny, ostry
β-Kariofilen	Przeciwzapalne, przeciwbólowe	drzewny, ostry
Limonen	Przeciwrzybiczne, antybakteryjne, przeciwłękowe	słodki, cytrynowy

1. Russo E.B., "Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects", British Journal of Pharmacology 163 (2011), 1344–1364.

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE:

Badania wykorzystujące medyczne konopie o wysokiej zawartości CBD są dostępne dla następujących dziedzin:







- Epilepsja¹

PRZEWODNIK MIARECZKOWANIA

- Obecnie nie ma jednolitej dawki początkowej dla produktów konopi medycznych ani jednolitej informacji o dawce.
- Pacjentom zaleca się powolne miareczkowanie w celu znalezienia optymalnej dawki dla maksymalnych efektów terapeutycznych i minimalnych działań niepożądanych.
- Czas rozpoczęcia zależy od sposobu administrowania.

DZIAŁANIE

Występowanie i czas trwania efektów przy wdychaniu i podawaniu doustnym⁴

	Wdychanie / Inhalacja	Podawanie doustne
Początek działania	 W ciągu kilku sekund lub minut	 W ciągu 30 minut do 2 godzin
Efekty szczytowe	 Pełne efekty szczytowe w ciągu 30 minut	 Pełne efekty szczytowe w ciągu 4 godzin
Czas trwania efektu	 Do 6 godzin lub dłużej	 Do 12 godzin lub dłużej

1. Devinsky, O. et al., "Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial", *Lancet Neurology* 15 (2016), 270-278.
2. Minister of Health HC, Health Canada. *Health Effects of Cannabis.*; 2017.